

IDENTIFICATION DU PATIENT

Nom Usuel :

Prénom :

Date De Naissance :

ETIQUETTE UH

MEDECIN PRESCRIPTEUR

Nom :

N° téléphone :

Cachet Hôpital :

.....

DATE DU PRELEVEMENT:

RECHERCHE D'ANTICORPS (cochez la case d'Ac recherchés)
Adresser des prélèvements de sérum et de LCR, si possible

DE SURFACE

**Anti-NMDAr, Anti-VGKC (LGI1, CASPR2),
Anti-AMPA1/2, Anti-DPPX, Anti-GABAb**

(Recherche réalisée dans le LCR)*

☐

INTRACELLULAIRE

**Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo, Anti-Tr,
Anti-GAD**

(Recherche réalisée dans le sérum: tube gel/sec ●)

☐

SITE DE PARIS :

01 57 27 44 42

RENSEIGNEMENTS

CLINIQUES :

Dr Dimitri PSIMARAS
dimitri.psimaras@aphp.fr

Tel : 01 42 16 04 35
Fax : 01 42 16 03 75

Dr Agusti ALENTORN
agusti.alentorn@aphp.fr

RESULTATS :

Marine GIRY
Marion BENAZRA

snp-psl@icm-institute.org

Tel : 01 57 27 44 42

La recherche d'un de ces auto-anticorps suivants:

**Anti-Amphiphysine, Anti-Ta/Ma2, Anti-SOX1, Anti-GABAa, Anti-IgLON5, Anti-Glycine,
Anti-Dopamine D2, Anti-mGluR1/R5, Anti-AK5, Anti-CV2**

nécessite des techniques supplémentaires pour lesquelles il faut adresser une demande
spécifique aux adresses: paraneo.neuronco@aphp.fr ou dimitri.psimaras@aphp.fr

FACTURATION :

**Centre de Recherche en
Neuro-Oncologie (CRNO)**
Association de Recherche
Médicale, Loi de 1901
Siret n° 44359682000011

Fédération de Neurologie Mazarin
47, Bd de l'Hôpital
75013 Paris

Tel: 01 42 16 04 01
Fax: 01 42 16 04 18
Port: 06 07 79 62 50
cno@free.fr

SYMPTOMATOLOGIE NEUROLOGIQUE

Date de début :

Cochez les cases utiles :

- ☐ Encéphalite limbique
- ☐ Troubles cognitifs
- ☐ Troubles psychiatriques
- ☐ Crises Comitiales
- ☐ Mouvements Anormaux
- ☐ Neuropathie périphérique
- ☐ Myoclonus/Opsoclonus
- ☐ Syndrome cérébelleux
- ☐ Atteinte du tronc cérébral
- ☐ Dysautonomie
- ☐ Neuromyotonie

TUMEUR

- ☐ Tumeur connue
 - Histologie :
 - Date de découverte :
- ☐ Suspicion de tumeur (*précisez*) :
- ☐ Tumeur inconnue

ATTENTION : TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS TRAITEE

***Analyse plus spécifique sur prélèvement de LCR, mais nécessité parfois de réaliser les analyses sur sérum (tube gel/sec)**
•Analyse plus spécifique sur prélèvement de sérum mais possiblement réalisable sur prélèvement de LCR